

内分泌疾患治療中の患者様へ 治療のご案内

1. 「バセドウ病」で抗甲状腺薬を内服している方

メルカゾール・プロパジール・ヨウ化カリウム

1週間程度の中断は問題ないことが多いです

長期の休薬で動悸や発汗、手の震えなどが出現します

もともとの内服量を継続してください



2. 「副腎皮質機能低下症」で副腎ステロイド薬を内服している方

コートリル・プレドニン・プレドニゾロン

内服中断で、だるさや食欲低下などが出現します

もともとの内服量を継続してください

体調不良時は増量あるいは点滴治療が必要となることがあります



3. 「尿崩症」で抗利尿ホルモン薬を内服している方

ミニリンメルト（水なしで服用すること）

デスモプレシン点鼻スプレー（冷所保存）

内服中断で尿量が増え、脱水になり、命にかかわる
内服中断時は1日3～5L以上の飲水が必要です

もともとの量を継続してください

のどが乾いたら必ず水を飲んでください



4. 「甲状腺機能低下症」で甲状腺ホルモン薬を内服している方

チラーチンS

1週間程度の中断は問題ないことが多いです

長期間の休薬でだるさ、寒がり、低体温症、無気力などが出現します

もともとの内服量を継続してください



5. 「副甲状腺機能低下症」で活性化ビタミンD薬を内服している方

ワンアルファ/アルファカルシドール

ロカルトロール/カルシトリオール

内服中断でしびれやけいれんなどが出現します

もともとの内服量を継続してください



*写真は1例です